



PROVIDEAN VIRATEC DP

VACUNA CONTRA PARVOVIRUS Y DISTEMPER CANINO
LIOFILIZADO+DILUYENTE
REG. SAN: RIP-BIO-45



FÓRMULA

Cada dosis de 0,5 ml de vacuna reconstituida contiene virus atenuados (DICT_{50%}):

Distemper canino ($\geq 10^5$),
Parvovirus canino ($\geq 10^7$)

ESPECIES



DOSIS

Administrar 0.5 mL por animal, vía subcutánea o intramuscular.

INDICACIONES DE USO

Vacuna viva atenuada contra la parvovirus y el distemper (moquillo) canino para uso en cachorros sanos y mayores a 4 semanas de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.

PLAN DE VACUNACIÓN SUGERIDO

Providean Viratec DP es una vacuna con elevada titulación viral, indicada para el comienzo de la vacunación en cachorros jóvenes, a partir de las 4 a 6 semanas de vida.

Primovacunación: se recomienda aplicar un programa de vacunación con un mínimo de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 a 4 semanas entre cada una de ellas. Si la última dosis del programa fue aplicada antes de las 16 semanas de vida, se recomienda administrar una dosis adicional debido a que los anticuerpos maternos pueden interferir en un adecuado desarrollo de la respuesta inmune del cachorro.

Revacunación: se recomienda la revacunación anual.

*El plan de vacunación, debe ser adaptado a criterio del Médico Veterinario de acuerdo a las condiciones y necesidades específicas de cada animal.



PROVIDEAN VIRATEC DP

VACUNA CONTRA PARVOVIRUS Y DISTEMPER CANINO
LIOFILIZADO+DILUYENTE
REG. SAN: RIP-BIO-45



FÓRMULA

Cada dosis de 0,5 ml de vacuna reconstituida contiene virus atenuados (DICT_{50%}):

Distemper canino ($\geq 10^5$),
Parvovirus canino ($\geq 10^7$)

ESPECIES



DOSIS

Administrar 0.5 mL por animal, vía subcutánea o intramuscular.

FORMA DE USO Y ADMINSTRACIÓN

Se recomienda la vacunación de animales en buen estado de salud y nutricional, libres de parásitos y normotérmicos. Evitar en lo posible situaciones de estrés producidas por condiciones adversas del entorno.

Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el contenido del diluyente provisto con la vacuna y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar suavemente hasta obtener una suspensión homogénea. Administrar 0,5 ml por vía subcutánea o intramuscular.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar.

Usar todo el contenido inmediatamente después de reconstituirlo.

Utilizar jeringas descartables estériles para su aplicación.

Evitar la vacunación de hembras gestantes.

Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha demostrado que este producto cumple con las normas de seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. Esto puede verse afectado por condiciones propias del individuo. Se recomienda evitar el contacto con fuentes contaminadas hasta que se haya completado el esquema básico de vacunaciones.



PROVIDEAN VIRATEC DP

VACUNA CONTRA PARVOVIRUS Y DISTEMPER CANINO
LIOFILIZADO+DILUYENTE
REG. SAN: RIP-BIO-45



FÓRMULA

Cada dosis de 0,5 ml de vacuna reconstituida contiene virus atenuados (DICT_{50%}):

Distemper canino ($\geq 10^5$),
Parvovirus canino ($\geq 10^7$)

REACCIONES ADVERSAS

Todas las vacunas pueden generar reacciones de hipersensibilidad. En tal caso el Médico Veterinario deberá administrar el tratamiento específico.

RETIRO

No aplica.

ESPECIES



PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja x 25 dosis (liofilizado+diluyente)

DOSIS

Administrar 0.5 mL por animal, vía subcutánea o intramuscular.