



RATA END INPEL

RODENTICIDA
PELLETS

REG.SAN. RIP-02-ADSP-01121



FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Bromadiolona	0.08 g
Excipiente c.s.p.	100.0 g

ESPECIES



DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN		
ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRODUCTO
 RATAS Y RATONES	800ppm	10-30g/ Porta cebo
Vía de administración: Oral Los cebos deben ser colocados estratégicamente en número adecuado cerca de madrigueras y en todas las zonas donde se presenten señales recientes de actividad.		
!! ANTÍDOTO !!		
Vitamina K		

INDICACIONES DE USO

RATA END INPEL es un rodenticida anticoagulante de segunda generación a base de bromadiolona, eficaz para el control de ratas y ratones con una sola ingestión. Actúa inhibiendo los mecanismos de coagulación sanguínea.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

FARMACOCINÉTICA

La bromadiolona presenta una farmacocinética caracterizada por una rápida absorción tras la administración oral y una marcada distribución hacia el hígado, que constituye su principal órgano de acumulación. En ratas (*Rattus norvegicus*), después de dosis únicas orales de 0,8 y 3 mg/kg, las concentraciones hepáticas se establecen rápidamente y alcanzan niveles entre 14 y 46 veces superiores a los observados en plasma. La eliminación es lenta y dependiente de la dosis, con vidas medias de eliminación de 25,7 horas para la dosis de 0,8 mg/kg y de 57,5 horas para la dosis de 3 mg/kg. Asimismo, las concentraciones en riñón son ligeramente superiores a las plasmáticas y presentan una vida media más prolongada. Aunque aproximadamente el 75 % de la dosis administrada se elimina durante los primeros cuatro días, la elevada afinidad de la bromadiolona por el tejido hepático favorece su persistencia en el organismo y explica la prolongada actividad anticoagulante característica de este rodenticida de segunda generación.

MECANISMO DE ACCIÓN

La bromadiolona es un rodenticida anticoagulante de segunda generación derivado de las 4-hidroxycumarinas. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la enzima vitamina K epóxido reductasa (VKOR), responsable de regenerar la vitamina K activa en el hígado. Al bloquear esta enzima, se impide la síntesis de los factores de coagulación



RATA END INPEL

RODENTICIDA

PELLETS

REG.SAN. RIP-02-ADSP-01121

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Bromadiolona 0.08 g
Excipiente c.s.p. 100.0 g

ESPECIES



DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN		
ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRODUCTO
 RATAS Y RATONES	800ppm	10-30g/ Porta cebo
Via de administración: Oral Los cebos deben ser colocados estratégicamente en número adecuado cerca de madrigueras y en todas las zonas donde se presenten señales recientes de actividad.		
!! ANTÍDOTO !!		
Vitamina K		

dependientes de vitamina K (II, VII, IX y X), produciendo una alteración progresiva de la coagulación sanguínea y finalmente hemorragias internas.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS

CONTRAINDICACIONES

- Evitar el contacto directo con la piel, ojos y mucosas.
- No comer, beber ni fumar durante su manipulación.
- Utilizar equipo de protección personal como guantes impermeables y, de ser posible, mascarilla durante la preparación o colocación del cebo.
- Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón después de su uso.
- Evitar la inhalación de polvo o contacto con el cebo abierto.
- No aplicar el producto en áreas donde haya acceso de niños o animales no objetivo.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico llevando la etiqueta del producto.

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Sobre x 20 g